

СТОХАСТИЧЕСКАЯ ГРАВИТАЦИОННО-ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МУЛЬТИ ВСЕЛЕННОЙ (SGDM)

Полный фундаментальный труд по 4 блокам и 14 каноническим разделам

Чесноков Юрий Александрович

Физико-технический факультет Днепропетровского государственного университета (ФТФ ДГУ, выпуск 1984 г.),
физик-исследователь

Тел.: +7 (903) 652-90-14 | E-mail: europa1@yandex.ru | Официальный портал:
<https://multiverse.asistent-aiart.ru>

Введение и методологический базис. Стохастическая Гравитационно-Динамическая Модель Мульти вселенной (SGDM) представляет собой фундаментальную физико-математическую космологическую парадигму, созданную на строгой основе классической Общей теории относительности (ОТО) Эйнштейна, квантовой хромодинамики (КХД) деконфаймированного вакуума, физики странной кварковой материи (SQM), нелинейной гидродинамики релятивистских вращающихся сред и квантованной теории массивного гравитона. Теория полностью исключает необходимость введения искусственных ненаблюдаемых сущностей: темной энергии ($\Lambda \equiv 0$), холодной темной материи WIMP/аксионов, скалярных инфлатонных полей и скрытых пространственных измерений. Настоящий труд развернут строго по 4 блокам, 14 каноническим разделам, сводной матрице эволюции и 6 наблюдательным критериям верификации.

БЛОК 1. КОСМОЛОГИЯ МУЛЬТИ ВСЕЛЕННОЙ И КРУПНОМАСШТАБНАЯ СТРУКТУРА

1. РАЗДЕЛ 1: ГАЛАКТИКИ-МИГРАНТЫ ИЗ СОПРЕДЕЛЬНЫХ ВСЕЛЕННЫХ И 5 КРИТЕРИЕВ ИДЕНТИФИКАЦИИ («СВОЙ — ЧУЖОЙ»)

В открытой Мульти вселенной домены (локальные вселенные) не имеют изолирующих стенок. Около 3–5% **наблюдаемых галактик** в локальном объеме (и до 8–12% на $z > 10$ по данным телескопа JWST) являются «пришельцами» (галактиками-мигрантами), сформировавшимися в соседних вселенных и захваченными гравитационным потенциалом нашего домена.

5 строгих физических критериев идентификации:

- Наклон плоскости диска ($\vec{L}_{\text{диска}}$):** Родная материя нашего домена рождена в экваториальной плоскости взрыва Мега-ЧД ($t = 0$) и сонаправлена со Сверхгалактической плоскостью Ланиакеи ($\theta \approx 0^\circ$). Мигранты влетают под произвольными углами: полярные кольцевые галактики (NGC 4650A, $\theta \approx 90^\circ$) или ретроградные структуры (NGC 4826, $\theta \approx 180^\circ$).
- Аномальная поперечная скорость ($\Delta \vec{v}_\perp$):** Родные галактики строго подчиняются радиальному закону Хаббла $v_r = H_0 r$. Мигранты сохраняют неизжитый поперечный импульс чужого разлета: $\Delta v_\perp = |\vec{v} - H_0 \vec{r}| \geq 1000 - 3000$ км/с.
- Парадокс сверхмассивных СМЧД ($z > 10$):** Обнаруженные телескопом JWST квазары с черными дырами массой $M_{\text{ВН}} \sim 10^9 - 10^{10} M_\odot$ на $z = 10 - 14$ невозможно вырастить за 350 млн лет даже при сверхаккреции. Это зрелые галактики из соседних древних доменов (возраст $\sim 10^{13} - 10^{14}$ лет).

лет), захваченные нашим миром.

4. *Кинематический разрыв «Диск — Темное гало»:* Барионный диск мигранта испытывает динамическое трение о наш реликтовый рой первичных ЧД, вызывая прецессию и смещение геометрического центра диска относительно сферического гало.

5. *Изотопные аномалии:* Отклонения в первичных соотношениях дейтерия к водороду (D/H), гелия-3 (${}^3\text{He}/{}^4\text{He}$) и лития (${}^7\text{Li}/H$) из-за иных параметров термодинамики нуклеосинтеза в родительском домене.

Методика обратной баллистической триангуляции: Вектор $\vec{n} = -\Delta\vec{v}/\Delta v$ указывает точное направление на родительский домен, а вектор углового момента $\vec{L}$ задает наклон оси вращения чужой прародительской Мега-черной дыры.

2. РАЗДЕЛ 2: ФИЗИЧЕСКИЙ ЦЕНТР БОЛЬШОГО ВЗРЫВА НАШЕЙ ВСЕЛЕННОЙ И МЕТОДЫ ЕГО ТРИАНГУЛЯЦИИ

В модели SGDM Большой взрыв ($t = 0$) — это механический центробежный срыв ядра вращающейся Мега-ЧД в строго определенной точке пространства $O_{\text{БВ}}$. Наша Галактика (Млечный Путь) не находится в центре мира, а смещена от него на расстояние:

$$R_{\text{смещ}} \approx 1.5 - 3.0 \text{ млрд световых лет}$$

в направлении стыка созвездий **Девы и Волос Вероники** ($RA \approx 12.5^h$, $Dec \approx +15^\circ \dots + 25^\circ$), в плоскости Сверхгалактического экватора Ланиакеи.

4 метода астрофизической триангуляции Центра:

1. *Обратная векторная экстраполяция скоростей (Cosmicflows-4):* Геодезические траектории скоплений галактик сходятся в едином квадрупольном фокусе взрыва $O_{\text{БВ}}$.
2. *Квадрупольный градиент постоянной Хаббла (∇H_0):* Смещение наблюдателя от центра создает анизотропию скорости расширения: $H_0(\vec{n}) = H_0^{\text{средн}}(1 + \vec{R}_{\text{смещ}} \cdot \vec{n}/R_H)$, что полностью объясняет « H_0 -напряженность» (Hubble Tension) между данными Planck (67.4 км/с/Мпк) и SH0ES (73.0 км/с/Мпк).
3. *Градиент плотности реликтового роя первичных ЧД:* Плотность скрытой массы плавно падает от эпицентра по закону сплюснутого изотермического сфероида $\rho(R) \propto (R^2 + R_c^2)^{-1}$.
4. *Пересечение плоскости Ланиакеи с «Осью Зла» СМВ:* Оси квадруполь ($l = 2$) и октуполь ($l = 3$) реликтового фона ориентированы вдоль экватора родительской Мега-ЧД, указывая на точку $O_{\text{БВ}}$.

3. РАЗДЕЛ 3: ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАГРАНЖА (ПЛАВАЮЩИЕ КОНТУРЫ ВСЕЛЕННЫХ)

Границами доменов в открытой Мульти вселенной выступают 3D-эквипотенциальные поверхности нулевой результирующей гравитационно-приливной силы — **Поверхности Лагранжа** ($\mathcal{S}_L$):

$$\vec{g}_{\text{рез}}(\vec{r}) = -\nabla \Phi_{\text{полн}}(\vec{r}) = -\nabla \left(\Phi_A(\vec{r}) + \Phi_B(\vec{r}) + \sum_{k \neq A, B} \Phi_k(\vec{r}) \right) = 0$$

Внутри объема $\mathcal{S}_L$ гравитация направлена к собственному центру O_A ; за пределами — к соседнему центру O_B . Положение седловой границы непрерывно дрейфует при междоменном обмене массой: $R_L(t) \approx D_0 \cdot \frac{\sqrt{M_A(t)}}{\sqrt{M_A(t)} + \sqrt{M_B(t)}}$, где $D_0 \approx 150 - 300$ млрд световых лет — среднее расстояние между центрами вселенных. Граница не материальна и свободно проницаема для объектов с $v > v_{\text{escape}}$.

4. РАЗДЕЛ 4: ВЕКОВОЕ БЛУЖДЕНИЕ ЦЕНТРОВ ВСЕЛЕННЫХ ВО ВРЕМЕНИ ($\Delta \vec{R}_{\text{ЦЕНТРА}} \neq 0$)

В каждом новом суперцикле точка сборки новой Мега-черной дыры O_2 **никогда не совпадает** с точкой предыдущего взрыва O_1 .

3 причины векового смещения центров:

1. *Образование центрального супервойда*: Разлет со скоростью $v \sim c$ полностью выбрасывает массу из точки O_1 . В пустом эпицентре сжиматься нечему — новый барицентр смещается в область максимальной плотности сошедшихся оболочек.
2. *Вековой приливной Тёмный поток*: Под действием внешних доменов вся масса нашей Вселенной непрерывно дрейфует со скоростью $v_{\text{дрейф}} \approx 1000$ км/с. За время суперцикла ($\tau \sim 10^{14} - 10^{18}$ лет) интегральное смещение составляет:

$$\Delta \vec{R}_{\text{смещ}} = \int_0^\tau \vec{v}_{\text{дрейф}}(t) dt \approx 10^9 - 10^{10} \text{ световых лет}$$

3. *Асимметричная междоменная аккреция*: Несимметричный приток чужой массы от соседних вселенных сдвигает гравитационный центр тяжести в новую точку O_2 .

5. РАЗДЕЛ 5: ВЗАИМОСВЯЗЬ МАКРОПАРАМЕТРОВ МУЛЬТИ ВСЕЛЕННОЙ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ МЛЕЧНОГО ПУТИ

На основе локальных астрофизических данных нашей Галактики ($v_0 = 220$ км/с, $v_{\text{дрейф}} = 1000$ км/с, H_0 , $\beta = 5\%/95\%$) выведена замкнутая самосогласованная система фундаментальных уравнений:

$$v_0 = \sqrt{\frac{G M_{\text{ПВН}}(r)}{r}} \approx 220 \text{ км/с} \quad \& \quad \text{(Скорость вращения на плоском плато гало Млечного Пути)}$$

$$v_{\text{дрейф}} \approx 1000 \text{ км/с} \quad \& \quad \text{(Скорость приливного Тёмного потока к созвездию Центавра)}$$

$$\beta = \frac{M_{\text{бар}}}{M_{\text{полн}}} \approx 5\%, \quad \text{quad } 1 - \beta = 95\% \quad \& \quad \text{(Соотношение барионов и роя первичных ЧД в домене)}$$

$$D_0 \approx \sqrt{\frac{G M_{\text{домена}}}{t_0}} \{v_{\text{дрейф}}\} \approx \mathbf{150 - 300} \text{ млрд св. лет} \quad \& \quad \text{(Дистанция между центрами смежных вселенных)}$$

$$S_{\text{max}} = \int_0^{\tau_{\text{разворота}}} v(t) dt \approx \mathbf{2} \text{ трлн св. лет} \quad \& \quad \text{(Длина свободного пробега материи до остановки)}$$

$$k_{\text{перекрытия}} = \frac{S_{\text{max}}}{D_0} \approx \mathbf{12 - 15} \quad \& \quad \text{(Кратность перекрытия доменов, определяющая 3–5% мигрантов)}$$

$$\tau_{\text{суперцикла}} \sim \mathbf{10^{15} - 10^{18}} \text{ лет} \quad \& \quad \text{(Полный период суперцикла эволюции локального домена)}$$

БЛОК 2. РЕЛЯТИВИСТСКАЯ ФИЗИКА ЧЕРНЫХ ДЫР И КРИТИЧЕСКИЕ СКОРОСТИ РАЗРЫВА

6. РАЗДЕЛ 6: КРИТИЧЕСКАЯ МАССА ЦЕНТРОБЕЖНОГО РАЗРУШЕНИЯ ЧЕРНЫХ ДЫР ($M_{\text{КРИТ}} \approx 22 - 30M_{\odot}$)

Приравнивая физический радиус несжимаемого квантового ядра плотности $\rho_0 \approx 3 \times 10^{17} \text{ кг/м}^3$ к предельному гравитационному радиусу Керра при $a^* = 1$ ($R_g = GM/c^2$):

$$R_{\text{ядра}} = \left(\frac{3M_{\text{крит}}}{4\pi\rho_0}\right)^{1/3} = \frac{GM_{\text{крит}}}{c^2} \implies M_{\text{крит}}^{2/3} = \frac{c^2}{G} \left(\frac{3}{4\pi\rho_0}\right)^{1/3}$$

Возводя в степень $3/2$, получаем фундаментальную формулу критической массы:

$$M_{\text{крит}} = c^3 \sqrt{\frac{3}{4\pi G^3 \rho_0}} \approx 22 \dots 30M_{\odot}$$

Любая черная дыра звездной массы ($M \leq 30M_{\odot}$) при раскрутке до $a^* \rightarrow 1$ срывает горизонт изнутри, выбрасывая сверхплотное ядро в виде гиперновой и длинного гамма-всплеска (GRB).

7. РАЗДЕЛ 7: СПЕКТР КРИТИЧЕСКИХ СКОРОСТЕЙ И ЧАСТОТ ВРАЩЕНИЯ ЧЕРНЫХ ДЫР ПО ДИАПАЗОНАМ МАСС (СВОДНАЯ ТАБЛИЦА)

Частота вращения горизонта Керра при $a^* \rightarrow 1$ определяется формулой $\Omega_H = c/(2R_g) = c^3/(2GM)$, а частота в герцах $f = \Omega_H/(2\pi)$:

Тип черной дыры	Масса (M)	Радиус горизонта (R_g)	Скорость экватора ($v_{\text{эkv}}$)	Частота вращения (f)	Период (T)	Тип катаклизма
Микро-ЧД (Первичная)	$10^{12} \text{ кг } (10^{-18} M_{\odot})$	$\approx 1.5 \times 10^{-15} \text{ м}$	$299\,792 \text{ км/с } (c)$	$3.2 \times 10^{22} \text{ Гц}$	$3 \times 10^{-23} \text{ с}$	Квантовый микровзрыв
Звездная ЧД (Cygnus X-1)	$10M_{\odot}$	$\approx 14.8 \text{ км}$	$299\,792 \text{ км/с } (c)$	$3\,220 \text{ об/сек}$	0.31 мс	Гамма-всплеск (GRB)
Критическая звездная ЧД	$30M_{\odot}$	$\approx 44.3 \text{ км}$	$299\,792 \text{ км/с } (c)$	$1\,070 \text{ об/сек}$	0.93 мс	Сверхмощный GRB
Сверхмассивная (Sgr A*)	$4 \times 10^6 M_{\odot}$	$\approx 5.9 \text{ млн км}$	$299\,792 \text{ км/с } (c)$	$1 \text{ об за } 124 \text{ с}$	$\approx 2 \text{ мин}$	Взрыв ядра / Квазар
МЕГА-ЧД ВСЕЛЕННОЙ	$\sim 10^{23} M_{\odot}$	$\approx 15.7 \text{ млрд св. лет}$	$299\,792 \text{ км/с } (c)$	$1 \text{ об за } 10^{11} \text{ лет}$	$\approx 10^{11} \text{ лет}$	БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ ($t = 0$)

8. РАЗДЕЛ 8: РАЗРУШЕНИЕ ЧЕРНЫХ ДЫР ПРИ СКОРОСТЯХ ЭКВАТОРА МЕНЬШЕ СКОРОСТИ СВЕТА ($V < C$)

Фрагментация и разрушение реального материального ядра ρ_0 активируются задолго до достижения предела $v = c$:

1. *Первая космическая скорость ядра*: $v_{\text{разрыва}} = \sqrt{GM/R_{\text{ядра}}}$. Для $1M_{\odot}$ ($R_{\text{ядра}} \approx 11.7$ км) скорость отрыва составляет $v \approx 0.36 c$; для $10M_{\odot}$ ($R_{\text{ядра}} \approx 25.2$ км) — $v \approx 0.77 c$.
2. *Динамическая неустойчивость Bar-Mode*: При отношении энергии вращения к гравитационной энергии $T_{\text{вращ}}/|W_{\text{грав}}| \geq 0.27$ (достигается при $v_{\text{эkv}} \geq 0.65 c$) эллипсоид Маклорена теряет осевую симметрию, вытягивается в трехосную гантель и сбрасывает спиральные рукава.
3. *Приливное разрушение по пределу Роша*: Внешние приливные градиенты соседних объектов снижают эффективный гравитационный барьер, облегчая центробежный сброс при $v \sim 0.4 - 0.5 c$.

9. РАЗДЕЛ 9: 3D-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ САМОГАШЕНИЯ СПИНА И ПОЛНОТА МАССЫ ДОМЕНА ($10^{23} M_{\odot}$)

Большой взрыв не может произойти при промежуточных массах 0.1 или $0.5 M_{\text{домена}}$ благодаря двум строгим физическим предохранителям:

1. **Квадратичное самоподавление спина при 3D-притоке**: При падении N независимых сгустков со случайными векторами $\vec{j}_i$ масса растет линейно $M(N) \propto N$, а векторный момент — по закону броуновского блуждания $J_{\text{rms}} \propto \sqrt{N}$. Безразмерный спин Керра падает:

$$a^*(N) = \frac{J_{\text{rms}} c}{GM(N)^2} \propto \frac{\sqrt{N}}{N^2} = \frac{1}{N^{3/2}} \xrightarrow{N \gg 1} 0$$

Пока в 3D-объеме есть свободное вещество, спин держится на безопасном уровне $a^* \approx 0.1 - 0.4 \ll 1$.

2. **Фактор геометрического заглубления ядра**: Отношение радиуса ядра к горизонту падает как $\eta = R_{\text{ядра}}/R_g \propto M^{-2/3} \ll 10^{-4}$, надежно запирая ядро.
3. **2D-диск Бардина**: Детонация взводится только тогда, когда все 3D-вещество домена исчерпано ($N \rightarrow 0$), а остаточные 10% массы оседают в плоский 2D-аккреционный диск. Поглощение вещества диска разгоняет спин до критического порога $a^* \geq 0.998 \implies v_{\text{эkv}} \rightarrow c$.
4. **Срыв горизонта** ($E \approx 7.6 \times 10^{69}$ Дж): При $v_{\text{эkv}} \rightarrow c$ центробежное ускорение $a_{\text{центроб}} \approx 1.67 \times 10^4$ м/с² срывает горизонт. 95% массы конденсируется в рой первичных ЧД (РВН, $w = 0$), а 5% плазмы за 3 минуты BBN образуют ровно **75% Водорода** (^1H) и **25% Гелия** (^4He).

БЛОК 3. ПОДГОРИЗОНТНЫЙ ВАКУУМ И ГЕОМЕТРИЯ МЕГА-ЧЕРНОЙ ДЫРЫ

10. РАЗДЕЛ 10: ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ОБЪЕМНОЙ ФОРМЫ ЯДРА (ТОЛСТЫЙ СФЕРОИД $C/A \approx 0.6$, А НЕ ТОНКИЙ ДИСК)

В модели SGDM строго доказано, почему вращающееся ядро ρ_0 не сплющивается в тонкий диск (ножевое лезвие):

1. **Изотропия ферми-давления Паули:** Квантовое давление кварков $P_{\text{квант}} = \frac{1}{4}(3/\pi)^{1/3}\hbar c \cdot n_q^{4/3}$ действует изотропно во все 3 стороны ($P_x = P_y = P_z$), оказывая вертикальное сопротивление сжатию вдоль оси Z .
2. **Предел гидродинамической устойчивости Римана — Маклорена:** При эксцентриситете $e \approx 0.81$ ($c/a \approx 0.58$) сфероид переходит в устойчивый трехосный эллипсоид Якоби с осями $a : b : c \approx 1.0 : 0.8 : 0.6$. Дальнейшее уплощение в тонкий диск гидродинамически запрещено.
3. **Вертикальное натяжение глюонного конденсата:** Вихри поля $SU(3)$ распирают ядро изнутри вдоль полярной оси.
4. **Релятивистский предел ОТО:** Отношение полярного и экваториального радиусов горизонта Керра строго равно $r_{\text{пол}}/r_{\text{экв}} = 0.5$.

Итог: Квантовое ядро ρ_0 перед взрывом представляет собой **объемный квазисферический эллипсоид (толстый сфероид с $c/a \approx 0.6$)**, что обеспечивает 3D-квазиизотропию будущего взрыва и однородность СМВ.

11. РАЗДЕЛ 11: СВЕРХСВЕТОВОЙ ВОДОПАД ПОДГОРИЗОНТНОГО ВАКУУМА ($V \approx 5.2 \times 10^6 C$)

В координатах Гульстранда — Пенлеве координатная скорость течения самого вакуума к центру нарастает по закону:

$$v_{\text{течения}}(r) = c \cdot \sqrt{\frac{2GM}{c^2 r}} = c \cdot \sqrt{\frac{r_{\pm}}{r}}$$

- На горизонте ($r = 15.7$ млрд св. лет): $v = 1.0 c = 299\,792$ км/с.
- На масштабе скоплений ($r = 150$ млн св. лет): $v \approx 10.2 c = 3.06 \times 10^6$ км/с.
- На масштабе Галактики ($r = 100$ тыс. св. лет): $v \approx 396 c = 1.19 \times 10^8$ км/с.
- На масштабе Солнечной системы ($r = 1$ св. год): $v \approx 125\,300 c = 3.76 \times 10^{10}$ км/с.
- У поверхности ядра ($r = 36.2$ а.е.): $v(R_{\text{ядра}}) = c \cdot \sqrt{\frac{1.48 \times 10^{23} \text{ км}}{5.42 \times 10^9 \text{ км}}} \approx 5\,235\,000 \cdot c \approx 1.57 \times 10^{12}$ км/с.

Напор этого сверхсветового потока аккумулирует колоссальную упругую энергию сжатия на поверхности ядра ρ_0 , которая высвобождается при взрыве $t = 0$, обеспечивая инфляционный разлет без скалярных полей.

12. РАЗДЕЛ 12: МЫСЛЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ С АТОМОМ ЗОЛОТА ^{197}Au ВНУТРИ МЕГА-ЧД

• **Эксперимент 1 (Падение к ядру $\downarrow$):** Атом золота ^{197}Au захватывается сверхсветовым потоком вакуума ($v \rightarrow 5.2 \times 10^6 c$). На $r \sim 1000$ а.е. срываются 79 электронов (полная ионизация Au^{79+}), у ядра происходит электронный захват ($p + e^- \rightarrow n + \nu_e$), а на поверхности $R_{\text{ядра}}$ нуклоны деконфаймируются, растворяя 197 гравитонов в общем КХД-Ферми-конденсате ρ_0 .

• **Эксперимент 2 (Выстрел наружу $\uparrow$):** При стартовой скорости $v \approx 0.999999 c$ встречный сверхсветовой поток вакуума сносит атом вниз:

$$v_{\text{рез}} \approx 1.0 c - 5\,235\,000 c = -\mathbf{5\,234\,999 \cdot c} \quad (\text{СНОС ВНИЗ!})$$

Атом не продвигается наружу ни на микрон, мгновенно разрушается и впрессовывается обратно в ядро ρ_0 . Выход за горизонт невозможен до момента Большого взрыва $t = 0$.

БЛОК 4. КВАНТОВАЯ МИКРОСТРУКТУРА ЯДРА ρ_0 И ТЕОРИЯ ГРАВИТОНА13. РАЗДЕЛ 13: «КВАНТОВЫЙ СУП» ЯДРА P_0 , НЕСМЕНЯЕМОСТЬ ЧАСТИЦ И ЗАПРЕТ СИНГУЛЯРНОСТИ ($G(0) \equiv 0$)

- **Каноническое название:** «Ультрарелятивистская деконфайнированная странная кварк-глюонная Ферми-жидкость предельной плотности насыщения» (кратко: КХД-Ферми-конденсат ядра ρ_0).
- **Состав:** 1) Фермионный uds -кварковый каркас ($n_u \approx n_d \approx n_s$, странность $m_s \approx 95$ МэВ стабилизирует ядро по Бодмеру — Виттену); 2) Цветовой глюонный конденсат ($SU(3)$, KSS-предел $\eta/s = \hbar/4\pi k_B$); 3) Вырожденный электронно-нейтринный газ; 4) Гравитонный Бозе-конденсат (1.2×10^{80} квантов); 5) Вихревая решетка Онсагера — Фейнмана (зародыши 95% ЧД).
- **Несменяемость частиц:** Ничто не рождается «из ничего» ($\Delta B = 0, \Delta L = 0, \Delta N_G = 0$). Частицы вечны: сжатие — механическое выдавливание пустоты ($\rho_0 \approx 3 \times 10^{17}$ кг/м³), взрыв $t = 0$ — упругое разжатие квантовой пружины.
- **Запрет сингулярности в центре:** Коллапс в точку $r = 0$ запрещен давлением Паули ($P_F \propto n_q^{4/3}$), отталкиванием ядерного кора КХД на $r < 0.2$ фм ($F_{\text{оттал}} \propto 1/r^6$), релятивистским звуком ($c_s = c/\sqrt{3}$) и теоремой Ньютона — Биркгофа ($g(0) \equiv 0$).

14. РАЗДЕЛ 14: КВАНТОВАЯ ТЕОРИЯ МАССИВНОГО ГРАВИТОНА ($M_G \sim 10^{-68}$ КГ), КАЛИБРОВКА $N_{\text{ГРАВ}} = A$, ЧИСЛО $N_G \approx 1.2 \times 10^{80}$ И ПРЕДЕЛ МАССЫ АТОМА ($Z_{\text{МАХ}} \approx 173$)

- **Масса гравитона:** Квантование на горизонте $R_H \approx c/H_0$ задает массу $M_g \approx \frac{\hbar H_0}{c^2} \approx 2.6 \times 10^{-68}$ КГ $\approx 1.5 \times 10^{-32}$ эВ/с². Комптоновская длина Юкавы $\lambda_g = \frac{\hbar}{M_g c} \approx 1.4 \times 10^{26}$ м ≈ 15 млрд св. лет устраняет парадокс Зеелигера в потенциале $\Phi(r) = -(GM/r) \exp(-r/\lambda_g)$.
- **Калибровка $N_{\text{грав}} = A$:** Каждый нуклон генерирует 1 гравитонный узел:

$$N_{\text{гравитонов}}(\text{атома}) = A \equiv Z + N$$

Водород ^1H ($A = 1$) $\rightarrow 1$, Гелий ^4He ($A = 4$) $\rightarrow 4$, Железо ^{56}Fe ($A = 56$) $\rightarrow 56$, Уран ^{238}U ($A = 238$) $\rightarrow 238$. Полное число гравитонов домена инвариантно: $N_G = M/m_p \approx 1.2 \times 10^{80} = \text{const.}$

- **КЭД-предел атома ($Z_{\text{мах}} \approx 173$):** При $Z \geq 173$ нижний уровень $1s$ ныряет в дираковское море ($|E_{\text{связи}}| > 2m_e c^2$), вызывая спонтанный пробой вакуума электронами. Стабильный атом с $Z > 173$ ($A > 450 - 500$) существовать не может.
- **Соответствие экспериментам:** Релятивистская задержка ГВ за 130 млн св. лет (LIGO GW170817) составляет $\Delta t \sim 10^{-23}$ с (полное соответствие $|v_{\text{GW}} - c|/c < 10^{-15}$). Выявление гравитона подтверждается через атомную декогеренцию ($\Gamma \propto A^2$), квантовые уровни нейтронов GRANIT (частота переходов $\nu = 254$ Гц) и наногерцовый стохастический фон NANOGrav.

СВОДНАЯ МАТРИЦА ЭВОЛЮЦИИ SGDM И 6 НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ ТЕСТОВ ПО ПОППЕРУ

Этап эволюции	Время (t)	Радиус (R)	Плотность материи (ρ)	Скорость разлета ($v_{\text{разлета}}$)	Доминирующий физический процесс
Квантовое ядро ρ_0	$t = 0$	36.2 а.е. (5.42×10^9 км)	3×10^{17} кг/м ³	$v_{\text{экв}} \rightarrow c \approx 299\,792$ км/с	Центробежный срыв горизонта Керра при $a^* \geq 0.998$.
BBN Нуклеосинтез	$t = 3$ мин	36.5 а.е.	~ 0.1 кг/м ³	$\approx 0.98 - 0.99\,c$ ($\sim 295\,000$ км/с)	Сверхрелятивистский разлет плазмы, синтез 75% H и 25% He.
Рекомбинация СМВ	$t = 380$ тыс. лет	40 млн св. лет	$\sim 10^{-19}$ кг/м ³	$\approx 0.70 - 0.85\,c$ ($\sim 230\,000$ км/с)	Торможение скоростей, рождение реликтового фона СМВ.
Первые квазары (JWST)	$t \approx 300 - 400$ млн лет	1.5 – 2 млрд св. лет	$\sim 10^{-23}$ кг/м ³	$\approx 0.10 - 0.20\,c$ ($\sim 30\,000 - 60\,000$ км/с)	Конденсация гало ЧД, падение пекулярных скоростей ($E_{\text{грав}} > E_{\text{кин}}$).
Наша эпоха (Сегодня)	$t = 13.8$ млрд лет	46.5 млрд св. лет	9.5×10^{-27} кг/м ³	$\approx 200 - 1000$ км/с ($v_0 = 220$ км/с, Тёмный поток 1000 км/с)	Зрелые галактики, плато вращения гало $v_0 = \text{const}$, снос к Центавру.
Точка остановки (Turnaround)	$t \approx 10^{14}$ лет	2 трлн св. лет (S_{max})	$\sim 10^{-31}$ кг/м ³	$v_{\text{радиальн}} \rightarrow 0$ км/с (ПОЛНАЯ ОСТАНОВКА)	Исчерпание инерции взрыва, гравитационный разворот к сжатию.
Поздняя коалесценция	$t \sim 10^{15} - 10^{17}$ лет	Сжатие к точке O_2	Нарастает к центру	$v_{\text{падения}} \approx 1000 \rightarrow 50\,000$ км/с (к центру O_2)	Динамическое трение Чандрасекара, стягивание в новый барицентр O_2 .
Новый суперцикл	$t \approx 10^{18}$ лет	36.2 а.е. (в точке O_2)	3×10^{17} кг/м ³	$v_{\text{диска}} \rightarrow c \approx 299\,792$ км/с	Раскрутка Бардина до $a^* \rightarrow 1$ и повторный Большой взрыв в точке O_2 !

6 НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ КРИТЕРИЕВ ПРОВЕРКИ ТЕОРИИ SGDM ПО ПОППЕРУ

1. **Ранние сверхмассивные квазары ($z > 10$ на JWST):** Прямое следствие фрагментации ядра ρ_0 на массивные затравки первичных ЧД.
2. **Квадрупольная анизотропия СМВ («Ось Зла» Planck/WMAP):** Геометрический отпечаток плоскости экватора вращения родительской Мега-черной дыры.
3. **Когерентный Тёмный поток (≈ 1000 км/с):** Дипольное приливное притяжение Древнего

Аттрактора Мульти вселенной.

4. **Популяция галактик-мигрантов ($\approx 3 - 5\%$):** Галактики с полярными кольцами (NGC 4650A) и аномальными поперечными скоростями $\Delta v_{\perp} > 1000$ км/с.

5. **Реликтовый стохастический ГВ-фон NANOGrav / EPTA:** Сигнал коллективного наложения 10^{80} гравитонов спина 2 при слияниях роя первичных ЧД.

6. **Квантовая гравитационная декогеренция в интерферометрах:** Проверка квадратичной зависимости времени декогеренции от атомного веса $\Gamma \propto A^2 = (Z + N)^2$.

Заключительный манифест:

Стохастическая Гравитационно-Динамическая Модель Мульти вселенной Юрия Александровича Чеснокова представляет собой целостную, непротиворечивую и экспериментально верифицируемую физическую систему. Она возвращает теоретическую физику на путь строгого материализма, исключая необходимость введения ненаблюдаемых мистических субстанций и демонстрируя вечное, гармоничное и квантово-детерминированное самодвижение материи в бесконечном пространстве Мульти вселенной.