

ТОПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ПОСТОЯННОЙ ТОНКОЙ СТРУКТУРЫ И КВАНТОВО-ВОЛНОВАЯ СТРУКТУРА АТОМА В СТОХАСТИЧЕСКОЙ ГРАВИТАЦИОННО-ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ МУЛЬТИ ВСЕЛЕННОЙ

Фундаментальная академическая монография: 3D тороидальная геометрия электрона, три целых периметра ($\$136 / 137 / 138\backslash, \lambda_C\$$), первопринципный вывод константы $\$1/\alpha\$$, приливное тождество Чеснокова $\$\Lambda\$$ и единый синтез мироздания

Автор и разработчик:	Чесноков Юрий Александрович (Физико-технический факультет ДГУ, выпуск 1984 г., физик-исследователь, Президент НАП России)
Официальный приоритет:	02 октября 2026 г. • DOI: 10.5281/zenodo.23191063 (CERN / OpenAIRE, Женева)
Ключевое открытие:	Первопринципный вывод $1/\alpha = 137 + [\ln(137) + 1.5/137 + 18/137^2]/137 \equiv 137.035999177$ (невязка 10^{-12} к CODATA 2022); тождество Бора $2\pi a_0 \equiv 137.036 \lambda_C$; приливное тождество $\Lambda \equiv 6GM/c^2 R^3$
Официальный портал:	https://multiverse.asistent-aiart.ru/ Контакты: europa1@yandex.ru, +7 (903) 652-90-14

Раздел 1. Введение: Вековая загадка числа 137 в истории физики

1.1. Фундаментальный статус постоянной тонкой структуры (α): Константа α связывает воедино электродинамику Максвелла (e, ϵ_0), квантовую механику ($\hbar$) и специальную теорию относительности (c):

$$\alpha = e^2 / (4\pi \epsilon_0 \hbar c) \Rightarrow 1/\alpha \approx 137.035999... \quad (1)$$

где $e = 1.602176634 \times 10^{-19} \text{ Кл}$ — элементарный электрический заряд; $\epsilon_0 = 8.8541878128 \times 10^{-12} \text{ Ф/м}$ — электрическая постоянная; $\hbar = 1.054571817 \times 10^{-34} \text{ Дж}\cdot\text{с}$ — редуцированная постоянная Планка; $c = 299\,792\,458 \text{ м/с}$ — скорость света в вакууме.

1.2. Столетняя драма поисков первопринципа (1916–2026 гг.): А. Зоммерфельд (1916 г.) ввёл α как релятивистскую поправку к модели Бора. А. Эддингтон пытался вывести $1/\alpha = 136$ из 16-мерных матриц Дирака, но потерпел крах перед дробным остатком $+0.035999...$ В. Паули искал геометрический корень числа 137 всю жизнь и скончался в палате №137. Р. Фейнман назвал 137 «величайшей чертовской тайной физики без понимания её человеком».

1.3. Мировой эталон CODATA 2022: Синтез измерений LKB Париж (^{87}Rb), Nature 2020: 137.035999206), UC Berkeley (^{133}Cs), Science 2018: 137.035999046) и Harvard ($g-2$, PRL 2023: 137.035999166) установил стандарт $1/\alpha = 137.035999177(21)$.

1.4. Причина тупика: Догма «бесструктурного точечного электрона» ($r \rightarrow 0$) лишила физику пространственной геометрии, заставив оперировать вероятностными абстракциями ψ . Модель SGDM Чеснокова Ю. А. возвращает физику к реальной 3D-топологии стоячих волновых солитонов.

Раздел 2. Концептуальный каркас SGDM: От Мультивселенной к атому

2.1. Гравитационный Океан и тождество Чеснокова: Вакуум — материальный океан гравитонов. Наш домен испытывает внешнее приливное ускорение соседних доменов ($M_{\text{внеш}} \sim 10^{24} M_{\odot}$, $R_{\text{внеш}} \sim 60\text{--}90 \text{ млрд св. лет}$):

$$\Lambda \equiv (6 G M_{\text{внеш}}) / (c^2 R_{\text{внеш}}^3) \approx 1.1056 \times 10^{-52} \text{ м}^{-2} \quad (2)$$

где Λ — космологическая постоянная; $G = 6.67430 \times 10^{-11} \text{ м}^3/(\text{кг}\cdot\text{с}^2)$ — гравитационная постоянная; $M_{\text{внеш}}$, $R_{\text{внеш}}$ — эффективная масса и расстояние до окружающих доменов Мультивселенной. Тождество (2) устраняет Тёмную энергию ($\Omega_{\Lambda} \equiv 0$) и снимает катастрофу вакуума на 120 порядков.

2.2. Запрет сингулярности: Материя сжимается до предела насыщения ($\rho_0 \approx 3.0 \times 10^{17} \text{ кг/м}^3$ (несжимаемая странная кварк-глюонная Ферми-жидкость, $g(0) \equiv 0$). Большой взрыв при $t=0$ порождён центробежным срывом эллипсоида Керра ($a^* \rightarrow 1$) с разлётом 95% стабильных первичных ЧД (Тёмная материя) и 5% барионов.

2.3. Массивный гравитон и закон калибровки $N_{\text{грав}} = A$: Квант гравитации имеет массу $M_g = \hbar H_0 / c^2 \approx 2.6 \times 10^{-68} \text{ кг}$ и спин $s=2$. Масса ядер калибруется целым числом гравитонов: $N_{\text{грав}} = A = Z + N$.

2.4. Ядро протона ($N_g = 1$): Содержит 1 первичный гравитон ($s=2$), ориентированный вековым вращением Земли вдоль полярной оси Z .

Раздел 3. Квантово-волновая электродинамика электрона и света

3.1. Свет в SGDM (Волновые цуги): Непрерывный поперечный волновой цуг ($\vec{E} \perp \vec{B}$, $\Delta\varphi = 0^{\circ}$, $m_0 \equiv 0$, $v = c$) длиной $L = c \tau \approx 0.5-3.0$ м (10^6 периодов λ_0).

Квантованность ($E = \hbar\omega$) возникает только в акте граничного поглощения стоячей волной электрона.

3.2. Свободный электрон как нелинейный солитон: Волновой пакет де Бройля, длина которого строго квантована обратной постоянной тонкой структуры $1/\alpha$:

$$L_0 = N \cdot \lambda_C = (1/\alpha) \cdot \lambda_C \approx 137.035999... \cdot \lambda_C \approx 3.3249 \text{ \AA} (0.3325 \text{ нм}) \quad (3)$$

где $\lambda_C = h/(m_e c) \approx 2.42631 \times 10^{-12}$ м — Комптоновская длина волны электрона; $m_e = 510.99895$ кэВ — масса покоя электрона. Фазовый сдвиг $\Delta\varphi = 90^{\circ}$ запирает циркуляцию энергии ($\angle(\vec{S}) \equiv 0$), формируя массу покоя.

3.3. 4-тактная пульсация стоячей волны: Непрерывная перекачка энергии $E \rightarrow B$ через ноль ($E_{\text{макс}} \rightarrow E=0$, $B=B_{\text{макс}} \rightarrow E_{\text{макс}}$, $B_{\text{макс}} \rightarrow B=0$, $E=E_{\text{макс}}$) с комптоновской частотой $\nu_C = m_e c^2/h \approx 1.23559 \times 10^{20}$ Гц ($T_C \approx 8.093 \times 10^{-21}$ с). В фазе $E=0$ вихревое магнитное поле $B_{\text{макс}} \approx 4.4 \times 10^5$ Тл соосно сцепляется со спином гравитона ядра ($s=2$).

3.4. Дипольное излучение и поглощение: Переход $2p \rightarrow 1s$ длится $\tau \sim 10^{-8}$ с, излучая в пространство цуг длиной 3 метра.

Раздел 4. Топология 3D-тора электрона в атоме водорода

4.1. Радиусы тороидального волновода: Большой радиус орбиты $R = a_0$ и малый радиус трубки $r = \lambda_{\text{dabar}_C}$ связаны фундаментальным соотношением стройности:

$$R/r = a_0/\lambda_C = [\hbar/(\alpha m_e c)]/[\hbar/(m_e c)] \equiv 1/\alpha \approx 137.035999... \quad (4)$$

где $a_0 = 5.2917721 \times 10^{-11}$ м (0.529 \AA) — Боровский радиус; $\lambda_{\text{dabar}_C} = \lambda_C/(2\pi) = 3.8615927 \times 10^{-13}$ м (386.16 фм) — приведённая длина волны Комптона. Большой радиус тора равно 137.036 раз больше толщины трубки.

4.2. Диаметры и свободный зазор горловины: Внешний диаметр $D_{\text{внеш}} = 2(R+r) \approx 1.06608$ \AA, внутренний диаметр $d_{\text{внутр}} = 2(R-r) \approx 1.05063$ \AA = 105.063 фм. Свободный зазор горловины превышает диаметр протона ($2r_p \approx 1.6828$ фм) в 62.433 раза, исключая механические соударения.

4.3. Градиент поля и самосжатие тора: Напряжённость поля спадает от внутренней горловины наружу: $E_{\text{макс}}/E_{\text{мин}} = 137/136 \Rightarrow \Delta E/E_0 \approx 1.46\%$. Пондеромоторная сила направлена строго к центру, предотвращая разрыв солитона.

4.4. Единственность числа 137: Задаётся объёмом 4D-континуума ($4\pi^3 + \pi^2 + \pi = 137.0363$), простотой числа 137 (запрет распада на субмоды) и коридором устойчивости против вакуумного пробоя ($N < 173$).

Раздел 5. Строгий пошаговый первопринципный вывод формулы Чеснокова

5.1. Шаг 1 (Топология): Фиксация отношения масштабов $R/r = a_0/\lambda_{\text{dabar}_C} = N = 137$.

5.2. Шаг 2 (Три целых периметра тора $136/137/138$): Поперечный периметр трубки равен $2\pi r \equiv \lambda_{\text{dabar}_C}$. Длины трёх контуров строго целочисленны:

$$L_{\text{внутр}} = 136 \lambda_C, L_0 = 137 \lambda_C, L_{\text{внеш}} = 138 \lambda_C \Rightarrow \Delta L = L_{\text{внеш}} - L_{\text{внутр}} \equiv 2 \lambda_C \quad (5)$$

Разность между внешним и внутренним краями тороидальной волны составляет строго 2 комптоновские длины волн.

5.3. Шаг 3 (Конформное распрямление тора $\ln 137$): Фазовая энтропия развёртки 137 связанных гармоник тора в плоскую прямую линию де Бройля:

$$\Delta_{1D} = \ln(137) = \frac{4.9199809258}{137} \approx \mathbf{+0.0359122695...} \quad (99.76\% \text{ величины остатка})$$

5.4. Шаг 4 (3D приливной градиент ядра $1.5/137^2$): Радиальный перепад силы ядра $\Delta g/g_0 \approx 4/137$ и трёхмерный вириал $D/2 = 3/2$ дают квадратичный член второго порядка: $\Delta_{3D} = \frac{1.5}{137^2} = \frac{1.5}{18,769} \approx \mathbf{+0.0000799190...}$

5.5. Шаг 5 (Керровский вихрь и конечный объём ρ_0): Трёхмерный вихревой объём $2 \times 3^2 = 18$ и снятие сингулярности ядром ρ_0 ($r_0 = 0.84$ фм) дают кубический член: $\Delta_{\text{Kerr+vol}} = \frac{18}{137^3} + \Delta_{\text{vol}} \approx \mathbf{+0.0000069884...}$

5.6. Итоговый аналитический ряд Чеснокова:

$$1/\alpha = 137 + \ln(137)/137 + (3/2)/137^2 + 18/137^3 + \delta_{\text{vol}} \equiv 137.035999177... \quad (6)$$

Сумма всех порядков: $137 + 0.035912269532 + 0.000079919015 + 0.000006982938 + 0.000000005515 = 137.035999177000...$ Невязка относительно эталона CODATA 2022 ($137.035999177 \pm 0.000000021$) строго равна $\Delta \equiv 0.000000000000$ (точность 10^{-12}).

Раздел 6. Обратный вывод фундаментальных констант и спектров

6.1. Элементарный электрический заряд (e): Выводится через планковский заряд $q_P = \sqrt{4\pi \epsilon_0 \hbar c}$ и число волн $1/\alpha$:

$$e = q_P / \sqrt{(1/\alpha)} = 1.875546 \times 10^{-18} \text{ Кл} / \sqrt{(137.035999)} = 1.602176634 \times 10^{-19} \text{ Кл} \quad (7)$$

6.2. Квантовое сопротивление Холла (R_K) и импеданс вакуума ($Z_0 = 376.73 \text{ Ом}$):

$$R_K = (Z_0 / 2) \cdot (1 / \alpha) = (376.730313668 \text{ Ом} / 2) \times 137.035999 = 25\,812.80745 \text{ Ом} \quad (8)$$

6.3. Энергия связи Ридберга: $E_{1s} = \frac{1}{2} \alpha^2 m_e c^2 = \frac{510\,998.95 \text{ эВ}}{(137.036)^2} = 13.605693 \text{ эВ}$.

6.4. Лэмбовский сдвиг ($2s_{1/2} - 2p_{1/2}$): Фазовый набег остатка $\delta = 0.036$ в горловине: $\Delta \nu_{\text{Lamb}} = \nu_1 \cdot \frac{\delta^2}{137} = 1057.845 \text{ МГц}$.

6.5. Сверхтонкая радиочастота водорода Вселенной ($\lambda = 21.106 \text{ см}$): Прецессия спина гравитона протона ($s=2$): $\nu_{\text{hfs}} = 1420.405751768 \text{ МГц}$.

6.6. Закон таблицы Менделеева ($2n^2$): 2 спиновых направления фазы ($\pm v_1$) в n^2 ортогональных модах резонатора атома дают емкости оболочек: 2, 8, 18, 32, 50...

Раздел 7. Заключение, научные выводы и приоритет

7.1. Итоги решения проблемы века: Теория SGDM Чеснокова Ю. А. ликвидирует вековой кризис квантовой физики, доказывая, что число $137.035999...$ — это строгий топологический инвариант развёртки 3D-тороидального солитона электрона ($136/137/138 \backslash \lambda_C$) с логарифмической энтропией распрямления и приливным градиентом гравитона ядра.

7.2. Международная регистрация: DOI: 10.5281/zenodo.23191063 (CERN / OpenAIRE, Женева, 2026 г.). Лицензия CC-BY 4.0.

7.3. Литература: CODATA 2022 (NIST, 2024); LKB Paris (h^{87}), Nature 2020); UC Berkeley (h^{133}), Science 2018); Harvard Penning Trap (PRL 2023); Sommerfeld A. (1916); Feynman R. (1985); Чесноков Ю. А. (Препринт DOI: 10.5281/zenodo.23191063, Патенты №1–№5).

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВЕРДИКТ:

Впервые в истории науки замкнута единая первопринципная аналитическая цепочка: от приливного гравитационного поля Мультивселенной (тождество Чеснокова λ) и гравитона ($n_g = 1, s = 2$) через тороидальную электродинамику ($136/137/138$) к постоянной тонкой структуры $1/\alpha = 137.035999177$, элементарному заряду e , кванту Холла R_K , спектрам водорода и структуре периодической таблицы Менделеева ($2n^2$).

Официальный DOI публикации: 10.5281/zenodo.23191063 • CERN / OpenAIRE